

Первые стадии инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), нередко протекают бессимптомно. Инфицированный человек может не знать о своем состоянии и заражать партнеров. Поэтому важно регулярно сдавать анализы на половые инфекции.

Основные симптомы ЗППП у мужчин:

- □□ боль и жжение при мочеиспускании
- 💵 белые или желтые выделения из полового члена
- □□ пятна, язвы, пузырьки или наросты на половом органе, коже промежности или на других частях тела
- □□ боль внизу живота.

Распространенные симптомы ЗППП у женщин:

□□ необычные выделения из влагалища

Первые стадии инфекций, передаваемых половым путем (ИППП) 11.05.2023 10:59

🛮 🗸 зуд и жжение половых органов
🛮 🗘 пятна, язвы, пузырьки, наросты во влагалище или вокруг него, а также различные
высыпания на коже промежности и на других частях тела
🛮 🗘 болезненность при половом акте или мочеиспускании
🛮 🗎 боль внизу живота.

ИППП могут вызвать серьезные последствия для здоровья. У женщин несвоевременно пролеченные инфекции могут привести к хроническим заболеваниям мочеполовой системы, бесплодию и внематочной беременности, у мужчин — к бесплодию и простатиту.